

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université Ziane Achour de Djelfa

Faculté des Sciences
et de la Technologie
Conseil Scientifique de la Faculté



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة زيان عاشور بالجلفة

كلية العلوم والتكنولوجيا
المجلس العلمي للكلية

الجلفة يوم : 09 جويلية 2018

المرجع : 03/م.ع.ك.ع.ت/2018 - مستخرج رقم 10

مستخرج من محضر اجتماع المجلس العلمي لكلية العلوم و التكنولوجيا

رقم: 03/م.ع.ك.ع.ت/2018، المنعقد بتاريخ: 02 جويلية 2018

في يوم الاثنين الثاني من شهر جويلية عام ألفين وثمانية عشر، وعلى الساعة (09:30) صباحا، انعقد اجتماع للمجلس العلمي لكلية العلوم والتكنولوجيا، في دورة عادية بقاعة الاجتماعات بإدارة الكلية، ومن بين النقاط المطروحة للنقاش في جدول الأعمال :

المصادقة على تقارير الخبرة لمطبوعة الدروس التي قام بإعدادها الأستاذ رزاوي محمد منير

أستاذ محاضر قسم (أ) بقسم الجذع المشترك علوم و تكنولوجيا

بعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة العلمية لقسم الجذع المشترك علوم و تكنولوجيا رقم 20/ل.ع.ك.ج.م.ع.ت.س.أ.ج.ز.ع.ج/18 المؤرخ في 03 جوان 2018 وبناء على مصادقة اللجنة العلمية على تقارير الخبرة الايجابية لكل من الأستاذ مسلمي فريد أستاذ بجامعة زيان عاشور بالجلفة و الأستاذ منصور عبد الوهاب أستاذ بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي بخصوص مطبوعة الدروس المعنونة ب :

« TD - Mathématique I ».

والتي قام بإعدادها كلا من الأستاذ رزاوي محمد منير أستاذ محاضر قسم (أ) و الأستاذ البار محمد أستاذ مساعد قسم (أ) بقسم الجذع المشترك علوم و تكنولوجيا لكلية العلوم و التكنولوجيا بجامعة زيان عاشور بالجلفة .

صادق المجلس العلمي على تقارير الخبرة الايجابية المذكورة سالفا بخصوص مطبوعة الأستاذ رزاوي محمد منير و

الأستاذ البار محمد .

جامعة زيان عاشور بالجلفة
المجلس العلمي للكلية
الرئيس
كلية العلوم والتكنولوجيا
امضاء: د/ بسيسة لخضر

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Ziane Achour de Djelfa

Faculté des Sciences et de la Technologie

Département du Tronc Commun en Sciences et Technologie- Première Année




Support Cours

Résumé de cours, Exercices avec Solutions

en Mathématiques 1

- 1^{er} Semestre-



Dr. REZAoui Mohamed Mounir

Dr. ELBAR Mohamed

Sommaire

| | |
|--|----|
| Introduction : | 01 |
| Chapitre I : Théorie des ensembles | 03 |
| 1. Rappel de Cours..... | 05 |
| 2. Série de TD..... | 09 |
| 3. Solution..... | 11 |
| Chapitre II : Raisonnement absurde récurrence | 17 |
| 1. Rappel de Cours..... | 19 |
| 2. Série de TD..... | 21 |
| 3. Solution..... | 22 |
| Chapitre III : Applications et Relations binaires | 27 |
| 1. Rappel de Cours..... | 29 |
| 2. Série de TD..... | 30 |
| 3. Solution..... | 32 |
| Chapitre IV : Les Fonctions réelles à une variable réelle | 35 |
| 1. Rappel de Cours..... | 37 |
| 2. Série de TD..... | 40 |
| 3. Solution..... | 44 |
| Annexe | 49 |
| Bibliographie | |

Introduction

Cet ouvrage est dédié aux étudiants premières années pour les disciplines:

- Sciences et technologies.
- Sciences de la Matière
- Math et informatique.

Qui va permettre aux étudiants de construire une base très forte en mathématiques en qualité d'observation, d'analyse et réflexion de calcul pour les préparés aux futures spécialités d'ingénieur, qui va couvrir l'ensemble des unités d'enseignement du programme pédagogique national de premier semestre

Chapitre I:

Théorie des Ensembles

Rappel de Cours

Définitions :


- Les objets mathématiques sont nommés **éléments**. Un **ensemble** est une *collection* ou un *groupement* d'éléments.
- L'assertion " a appartient à E " se note $a \in E$. L'assertion " b n'appartient pas à E " se note $b \notin E$.
- Un ensemble est dit vide s'il n'a aucun élément et nous notons l'**ensemble vide** ϕ ou par $\{ \}$.

Exemples d'ensembles


1. Les entiers naturels **0,1, 2, 3,** forment un ensemble qui se note N .
2. Les entiers relatifs **..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...** forment un ensemble qui se note \mathbb{R} .
3. Les nombres rationnels (de la forme p/q où $p \in Z$ et $q \in N^*$) forment un ensemble noté Z
4. Les points du plan forment un ensemble.

On peut trouver quelques opérations importantes dans la théorie des ensembles :


Réunion : L'union entre deux sous-ensembles A et B d'un ensemble W est l'ensemble des éléments de W qui appartiennent à A ou à B (ou aux deux). L'union de A et B est notée $A \cup B$ qui est schématisé par la zone verte:




Intersection : L'intersection de deux sous-ensembles A et B d'un ensemble W est l'ensemble des éléments de W qui appartiennent à A et à B au même temps. L'union de A et B est notée $A \cap B$ qui est schématisé par la zone verte.



Complément : Si A est un sous-ensemble de W, le complémentaire de A dans W est l'ensemble des éléments de W qui n'appartiennent pas à A qui est notée A^c ou \bar{A} , ce dernier est schématisé par la zone verte.



Différence: La différence de deux sous-ensembles A et B d'un ensemble W est l'ensemble des éléments de W qui appartiennent à A et pas à B, qui est notée par $A \setminus B$ ou $A - B$.



Différence symétrique: La différence symétrique de deux sous-ensembles A et B d'un ensemble W est l'ensemble des éléments de W qui appartiennent à A et pas à B, ou qui appartiennent à B et pas à A noté par $A \Delta B$.

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Cardinal : On dit qu'un ensemble est fini lorsqu'il existe un entier naturel n_0 et une bijection de cet ensemble sur $[1, n_0]$. Dans le cas contraire, il est dit infini.

Définition. Soit A un ensemble fini, on appelle cardinal de A, et on le note Card A ou $\#A$, le nombre n_0 d'éléments de A. Si $A = \emptyset$, alors card A = 0.

La formule fondamentale pour le calcul des cardinaux d'ensembles finis, est :

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card} A + \text{Card} B - \text{Card}(A \cap B)$$

Dans ce qui suit A et B sont des ensembles finis.

- Si $A \subset B$, alors $\text{card} A \leq \text{card} B$.
- Si $A \subset B$, et $A \neq B$, alors $\text{card} A < \text{card} B$
- $\text{Card}(A \times B) = \text{Card} A \times \text{Card} B$.
- Si E est un ensemble fini à n éléments c'est-à-dire $\text{Card} E = n$, on note: $P(E)$ l'ensemble de toutes les parties (de tous les sous-ensembles) de E et on a le résultat :

$$\text{Card}(P(E)) = 2^n$$

Propriétés des opérations élémentaires

- L'intersection et l'union sont idempotentes : $\forall A, A \cap A = A$ et $A \cup A = A$

- L'intersection et l'union sont commutatives :

$$\forall A, \forall B, A \cap B = B \cap A \text{ et } A \cup B = B \cup A$$

- L'intersection et l'union sont associatives :

$$\forall A, \forall B, \forall C (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$\forall A, \forall B, \forall C (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

- L'intersection est distributive par rapport à l'union : $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$$\forall A, \forall B, \forall C A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- L'union est distributive par rapport à l'intersection :

$$\forall A, \forall B, \forall C A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Série de TD N°01

Théorie des Ensembles

Exercice 01 : Trouver $P(X)$, $X \cap Y$, $X \cup Y$, $X - Y$, $Y \setminus X$, $X \times Y$, $Y \times X$, $X \Delta Y$ si :

1. $X = \{1,2,3,5\}, Y = \{7,3\}$
2. $X = \{2n, n \in \mathbb{N}\}, Y = \{3n, n \in \mathbb{N}\}$

Exercice 02: Soient $A =]-\infty, 3]$, $B =]-2, 7]$, $C =]-5, +\infty[$ trois parties de \mathbb{R} .

Déterminer $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap C$, $B \cup C$, $A \setminus B$, $\mathbb{R} \setminus A$, $(\mathbb{R} \setminus A) \cap (\mathbb{R} \setminus B)$, $(\mathbb{R} \setminus (A \cup B))$, $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ et $A \cap (B \cup C)$

Exercice 03: Soient X et Y deux ensembles. Démontrer les propositions suivantes:

- a) $X \subset Y \Leftrightarrow X \cup Y = Y \Leftrightarrow X \cap Y = X$
- b) $(Z \subset X \text{ et } Z \subset Y) \Leftrightarrow Z \subset (X \cap Y)$
- c) $(X \cap Y) \setminus (X \cap Z) = X \cap (Y \setminus Z)$
- d) $(X \cup Y) \setminus Z = (X \setminus Z) \cup (Y \setminus Z)$

Exercice 04: Soient A , B et C trois ensembles. Montrer que :

$$1. C_A^{A \cap B} = (A \cup B) \setminus B \qquad 2. A = A \cup (A \cap B)$$

Exercice 05 : Soit A, B, C trois sous-ensembles de E . Montrer que :

1. $A = B \Leftrightarrow A \cup B = A \cap B$
2. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
3. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
4. $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$
5. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
6. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
7. $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$

Exercice 06 :

On rappelle que l'on note $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

1) Montrer que $(A \cap B) \cap \overline{(A \cap C)} = A \cap B \cap \overline{C}$

$$(A \cap C) \cap \overline{(A \cap B)} = A \cap C \cap \overline{B}$$

En déduire que $(A \cap B) \Delta (A \cap C) = A \cap (B \Delta C)$

2) Montrer que $(A \cup B) \cap \overline{(A \cup C)} = \overline{A} \cap B \cap \overline{C}$

$$(A \cup C) \cap \overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap C \cap \overline{B}$$

En déduire que $(A \cup B) \Delta (A \cup C) = \overline{A} \cap (B \Delta C)$

Exercice 07: Soit A et B des sous-ensembles d'un ensemble E .

Démontrer les lois de Morgan :

a. $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c$

b. $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$

Corrigé type de la Série de TD N°01

Exercice 01 : Trouver $P(X)$, $X \cap Y$, $X \cup Y$, $X - Y$, $Y \setminus X$, $X \times Y$, $Y \times X$, $X \Delta Y$ si

1. $X = \{1,2,3,5\}$, $Y = \{7,3\}$

$$X \cap Y = \{3\}$$

$$X \cup Y = \{1, 2, 3, 5, 7\}$$

$$X - Y = \{1, 2, 5\}$$

$$Y \setminus X = \{7\} \text{ Ensemble de } Y \text{ Sauf } X$$

$$X \setminus Y = \{1, 2, 5\} \text{ Ensemble de } X \text{ Sauf } Y$$

$$X \times Y = \{(1, 7), (1, 3), (2, 7), (2, 3), (3, 7), (3, 3), (5, 7), (5, 3)\}$$

$$Y \times X = \{(7, 1), (3, 1), (7, 2), (3, 2), (7, 3), (3, 3), (7, 5), (3, 5)\}$$

$$X \Delta Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X) = \{1, 2, 5\} \cup \{7\} = \{1, 2, 5, 7\}$$

2. $X = \{2n, n \in \mathbb{N}\}$, $Y = \{3n, n \in \mathbb{N}\}$

$$X = 2n = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, \dots\}$$

$$Y = 3n = \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, \dots\}$$

$$X \cap Y = \{0, 6, 12, 18, 24, \dots\} = \{6n, n \in \mathbb{N}\}$$

$$X \cup Y = \{0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, \dots\} = \mathbb{N} - \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, \dots\} = \mathbb{N} - \{6n \pm 1, n \in \mathbb{N}\}$$

$$X - Y = \{2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, \dots\}$$

$$Y \setminus X = \{3, 9, 15, 21, \dots\}$$

$$X \times Y = \{(2n, 3n)\}$$

$$Y \times X = \{(3n, 2n)\}$$

$$X \Delta Y = \{ \}, \text{ le } \Delta \text{ est appelé la différence symétrique}$$

Exercice 03: Soient X et Y deux ensembles. Démontrer les propositions suivantes :

a) $X \subset Y \Leftrightarrow X \cup Y = Y \Leftrightarrow X \cap Y = X$

$$X \subset Y \Leftrightarrow X \cup Y = Y$$

Supposons que $X \subset Y$

Si $x \in X \subset Y$, alors $x \in Y$, alors $x \in X \cup Y$, par conséquent $X \cup Y = Y$. Donc $X \cup Y \subset Y$

On a montré que $X \subset Y \Leftrightarrow X \cup Y = Y$

Supposons que $X \cup Y = Y$

Si $x \in X$, alors $x \in X \cup Y = Y$, Donc $x \in Y$

On a montré que $X \cup Y = Y \Leftrightarrow X \subset Y$

Finalement $X \subset Y \Leftrightarrow X \cup Y = Y$

$$X \subset Y \Leftrightarrow X \cap Y = X$$

Supposons que $X \subset Y$

Si $x \in X \subset Y$, alors $x \in X$, alors $x \in X \cap Y$, par conséquent $X \cap Y = X$

On a montré que $X \subset Y \Leftrightarrow X \cap Y = X$

Supposons que $X \cap Y = X$

Si $x \in X \cap Y$, alors $x \in X$, Donc $X \subset Y$

On a montré que $X \cap Y = X \Leftrightarrow X \subset Y$

Finalement $X \subset Y \Leftrightarrow X \cap Y = X$

b) $(Z \subset X \text{ et } Z \subset Y) \Leftrightarrow Z \subset (X \cap Y)$

$$(Z \subset X \text{ et } Z \subset Y) \Leftrightarrow Z \subset (X \cap Y)$$

Supposons que $Z \subset X$ et $Z \subset Y$

Si $x \in Z \subset Y$ et $x \in Z \subset X$, alors $x \in X \cap Y$, par conséquent $x \in Z \subset X \cap Y$

On a montré que $Z \subset X$ et $Z \subset Y \Leftrightarrow Z \subset X \cap Y$

Supposons que $Z \subset X \cap Y$

Si $x \in Z$, alors $x \in Z \subset X \cap Y$, Donc $Z \subset X$ et $Z \subset Y$

On a montré que $Z \subset X \cap Y \Leftrightarrow Z \subset X$ et $Z \subset Y$

Finalement $Z \subset X$ et $Z \subset Y \Leftrightarrow Z \subset X \cap Y$

c) $(X \cap Y) \setminus (X \cap Z) = X \cap (Y \setminus Z)$

$$\begin{aligned} (X \cap Y) \setminus (X \cap Z) &= (X \cap Y) \cap (\overline{X \cap Z}) = (X \cap Y) \cap (\overline{X} \cup \overline{Z}) \\ &= ((X \cap Y) \cap \overline{X}) \cup ((X \cap Y) \cap \overline{Z}) = (X \cap Y \cap \overline{X}) \cup (X \cap Y \cap \overline{Z}) \\ &= \underbrace{(X \cap \overline{X} \cap Y)}_{\emptyset} \cup (X \cap Y \cap \overline{Z}) = X \cap (Y \cap \overline{Z}) = X \cap (Y \setminus Z) \end{aligned}$$

Alors $(X \cap Y) \setminus (X \cap Z) = X \cap (Y \setminus Z)$

ou par une autre méthode :

$$(X \cap Y) \setminus (X \cap Z)$$

Supposons que $X \cap (Y \setminus Z)$

Si $x \in Z \subset Y$ et $x \in Z \subset Y$, alors $x \in X \cap Y$, par conséquent $x \in Z \subset X \cap Y$

On a montré que $Z \subset X$ et $Z \subset Y \Leftrightarrow Z \subset X \cap Y$

Supposons que $(X \cap Y) \setminus (X \cap Z)$

Si $x \in Z$, alors $x \in Z \subset X \cap Y$, Donc $Z \subset X$ et $Z \subset Y$

On a montré que $Z \subset X \cap Y \Leftrightarrow Z \subset X$ et $Z \subset Y$

Finalemment $Z \subset X$ et $Z \subset Y \Leftrightarrow Z \subset X \cap Y$

d) $(X \cup Y) \setminus Z = (X \setminus Z) \cup (Y \setminus Z)$

$$(X \cup Y) \setminus Z = (X \setminus Z) \cup (Y \setminus Z)$$

$$(X \setminus Z) \cup (Y \setminus Z) = (X \cap \overline{Z}) \cup (Y \cap \overline{Z}) = (X \cup Y) \cap \overline{Z} = (X \cup Y) \setminus Z$$

$$(X \cup Y) \setminus Z = (X \cup Y) \cap \overline{Z} = (X \cap \overline{Z}) \cup (Y \cap \overline{Z}) = (X \setminus Z) \cup (Y \setminus Z)$$

Exercice 06 : On rappelle que $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

3) Montrons que $(A \cap B) \cap \overline{(A \cap C)} = A \cap B \cap \overline{C}$

$$\begin{aligned} (A \cap B) \cap \overline{(A \cap C)} &= (A \cap B) \cap (\overline{A \cap C}) = \underbrace{((A \cap B) \cap \overline{A})}_{\emptyset} \cup ((A \cap B) \cap \overline{C}) = (A \cap B) \cap \overline{C} \\ &= (A \cap B) \setminus C \end{aligned}$$

Et que : $(A \cap C) \cap \overline{(A \cap B)} = A \cap C \cap \bar{B}$

$$\begin{aligned} (A \cap C) \cap \overline{(A \cap B)} &= (A \cap C) \cap (\bar{A} \cup \bar{B}) = \underbrace{((A \cap C) \cap \bar{A})}_{\emptyset} \cup ((A \cap C) \cap \bar{B}) = (A \cap C) \cap \bar{B} \\ &= (A \cap C) \setminus B \end{aligned}$$

La déduction que $(A \cap B) \Delta (A \cap C) = A \cap (B \Delta C)$

$$\Rightarrow X \setminus Y = \underbrace{(A \cap B)}_X \setminus \underbrace{(A \cap C)}_Y = (A \cap B) \cap \overline{(A \cap C)} = (A \cap B) \cap \bar{C} = A \cap (B \setminus C)$$

$$Y \setminus X = \underbrace{(A \cap C)}_Y \setminus \underbrace{(A \cap B)}_X = (A \cap C) \cap \overline{(A \cap B)} = (A \cap C) \cap \bar{B} = A \cap (C \setminus B)$$

$$X \Delta Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X) = (A \cap B) \Delta (A \cap C) = ((A \cap B) \setminus C) \cup ((A \cap C) \setminus B)$$

$$\Leftrightarrow (A \cap B) \Delta (A \cap C) = (A \cap (B \setminus C)) \cup (A \cap (C \setminus B)) = A \cap ((B \setminus C) \cup (C \setminus B)) = A \cap (B \Delta C)$$

$$\Rightarrow (A \cap B) \Delta (A \cap C) = A \cap (B \Delta C)$$

4) Montrer que $(A \cup B) \cap \overline{(A \cup C)} = \bar{A} \cap B \cap \bar{C}$

$$(A \cup B) \cap \overline{(A \cup C)} = (A \cup B) \cap (\bar{A} \cap \bar{C}) = \left(\underbrace{(A \cap \bar{A} \cap \bar{C})}_{\emptyset} \cup (B \cap \bar{A} \cap \bar{C}) \right) = \bar{A} \cap B \cap \bar{C}$$

$(A \cup C) \cap \overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap C \cap \bar{B}$

$$\begin{aligned} (A \cup C) \cap \overline{(A \cup B)} &= (A \cup C) \cap \bar{A} \cap \bar{B} = A \cap (\bar{A} \cap \bar{B}) \cup C \cap (\bar{A} \cap \bar{B}) \\ &= \underbrace{(A \cap \bar{A} \cap \bar{B})}_{\emptyset} \cup (C \cap \bar{A} \cap \bar{B}) = \bar{A} \cap C \cap \bar{B} \end{aligned}$$

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

La déduction que $(A \cup B) \Delta (A \cup C) = \bar{A} \cap (B \Delta C)$

$$\Rightarrow X \setminus Y = \underbrace{(A \cup B)}_X \setminus \underbrace{(A \cup C)}_Y = (A \cup B) \cap (\overline{A \cup C}) = \bar{A} \cap B \cap \bar{C} = \bar{A} \cap (B \setminus C)$$

$$Y \setminus X = \underbrace{(A \cup C)}_Y \setminus \underbrace{(A \cup B)}_X = (A \cup C) \cap (\overline{A \cup B}) = \bar{A} \cap C \cap \bar{B} = \bar{A} \cap (C \setminus B)$$

$$\begin{aligned} X \Delta Y &= (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X) = (A \cup B) \Delta (A \cup C) = (\bar{A} \cap (B \setminus C)) \cup (\bar{A} \cap (C \setminus B)) \\ &= \bar{A} \cap ((B \setminus C) \cup (C \setminus B)) = \bar{A} \cap (B \Delta C) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (A \cup B) \Delta (A \cup C) = \bar{A} \cap (B \Delta C)$$

Chapitre II:

Raisonnement par Récurrence

Rappel de Cours

Raisonnement par Récurrence

Rappel :

Pour démontrer par récurrence qu'une proposition (P_n) est vraie pour tout entier naturel supérieur ou égal à un entier naturel n_0 fixé, on procède en trois étapes.

Avant de commencer, on note (P_n) la proposition que l'on va démontrer.

- Étape 1 : Initialisation

On vérifie (P_{n_0}) est vraie, c'est-à-dire que la proposition est vraie pour le premier indice n_0 . On dit qu'on a initialisé la récurrence.

- Étape 2 : Hérédité

On suppose que pour un entier n quelconque $n > n_0$, (P_n) est vraie, et sous cette hypothèse (dite de récurrence) on démontre que la proposition (P_{n+1}) est vraie. On a ainsi prouvé que l'hypothèse de récurrence « (P_n) vraie » est héréditaire.

- Étape 3 : Conclusion

Lorsque les deux premières étapes ont été réalisées, on conclut : par récurrence la proposition (P) est vraie pour tout entier naturel n ($n > n_0$).

Raisonnement par L'absurde

Rappel :

Le raisonnement par l'absurde est un raisonnement qui permet de démontrer qu'une affirmation est vraie en montrant que son contraire est faux. Il s'appuie sur règle logique que :

Si "non P" est fausse, alors P est vrai

Le raisonnement consiste à supposer que l'affirmation contraire est vraie et à tirer les conséquences que cela pourrait avoir **une seule conséquence absurde, manifestement fausse ou une contradiction** permet d'affirmer que l'affirmation contraire est fausse et donc d'en conclure que l'affirmation initiale est vraie.

Autrement dite : pour montrer que la proposition $P \Rightarrow Q$: on suppose à la fois que P est vraie et Q est fausse et on cherche une contradiction. Ainsi P est vraie alors Q doit être vraie donc $P \Rightarrow Q$ est vraie.

Série de TD N°02

Raisonnement par Récurrence

Exercice 01 : Démontrer par **ré**currence que pour tout entier $n \geq 1$:

1. $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

2. $1 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

3. $1 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

4. $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$

Exercice 02: x est un réel positif.

Démontrer que pour tout entier naturel n , $(1+x)^n \geq 1+nx$

Exercice 03: On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3.$$

Démontrer que pour tout entier naturel n , $u_n = \frac{-5}{2^n} + 6$.

Raisonnement par L'absurde

Exercice 04: Montrez en utilisant un raisonnement par l'absurde que :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \text{ est pair} \Rightarrow n \text{ est pair}$
2. $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$)

Exercice 05: Montrez en utilisant un raisonnement par l'absurde que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^* : \sqrt{1+x^2} \neq 1 + \frac{x^2}{2}$$

Exercice 06 : Montrez en utilisant un raisonnement par l'absurde que :

1. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$
2. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, ac \geq bc \text{ et } c > 0 \Rightarrow a \geq b$

Corrigé type de la Série de TD N°02

Raisonnement par Récurrence

Exercice 01:

Démonstration de la formule vue l'introduction, à l'aide du raisonnement par récurrence:
 Montrons que pour tout entier naturel n

1. $1+2+3+4+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ Notons (P_n) la proposition :

- Étape 1 : Initialisation

La proposition est vraie car (P_1) est vraie car $1 = \frac{1(1+1)}{2}$

La proposition est vraie car (P_2) est vraie car $1+2 = \frac{2(2+1)}{2} = 3$

On conçoit et on admet que si l'on sait démontrer que « (P_n) vraie » entraîne « (P_{n+1}) vraie », alors la proposition est vraie pour tout entier naturel $n \geq 1$.

- Étape 2 : Hérédité

Supposons donc que (P_n) est vraie pour un entier naturel n , c'est-à-dire que pour un entier naturel n :

$$P_n : 1+2+3+4+\dots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$P_{n+1} : 1+2+3+4+\dots+n+(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Comme (P_n) est vraie, alors dans la somme $1+2+3+4+\dots+(n-1)+n$, on peut remplacer les n premiers termes par $\frac{n(n+1)}{2}$.

On obtient alors :

$$\underbrace{1+2+3+4+\dots+(n-1)+n}_{P_n} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{P_{n+1}} = \frac{n(n+1)+2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Alors $1+2+3+4+\dots+(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ est vraie, Donc (P_{n+1}) vraie

• Étape 3 : Conclusion

(P_n) est vraie pour tout entier naturel $n > 0$, c'est-à-dire pour tout entier naturel n

$$1+2+3+4+\dots+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

2. $1^2+2^2+3^2+4^2+\dots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ Notons (P_n) la proposition :

• Étape 1 : Initialisation

La proposition est vraie car (P_1) est vraie car $1 = \frac{1(1+1)(2+1)}{6} = 1$

La proposition est vraie car (P_2) est vraie car $1+2^2 = \frac{2(2+1)(4+1)}{6} = 5$

On conçoit et on admet que si l'on sait démontrer que « (P_n) vraie » entraîne « (P_{n+1}) vraie », alors la proposition est vraie pour tout entier naturel $n \geq 1$.

• Étape 2 : Hérédité

Supposons donc que (P_n) est vraie pour un entier naturel n , c'est-à-dire que pour un entier naturel n :

$$P_n : 1^2+2^2+3^2+4^2+\dots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$P_{n+1} : 1^2+2^2+3^2+4^2+\dots+(n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

Comme (P_n) est vraie, alors dans la somme $1^2+2^2+3^2+4^2+\dots+(n-1)^2+n^2$, on peut remplacer les n premiers termes par $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

On obtient alors :

$$\begin{aligned} \underbrace{1^2+2^2+3^2+4^2+\dots+(n-1)^2+n^2}_{P_n} + (n+1)^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \end{aligned}$$

Alors $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$ est vraie, Donc (P_{n+1}) vraie

• **Étape 3 : Conclusion**

(P_n) est vraie pour tout entier naturel $n > 0$, c'est-à-dire pour tout entier naturel n

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Raisonnement par L'absurde

Exercice 04: Montrez en utilisant un raisonnement par l'absurde que:

1. Montrons $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \text{ est pair} \Rightarrow n \text{ est pair}$

Raisonnement par l'absurde, $\forall n \in \mathbb{N}, n \text{ est impair} \Rightarrow n^2 \text{ est pair}$

Supposons que :

$$n = 2.k + 1 \text{ est impair} \Rightarrow n^2 = (2.k + 1)^2 = 4k^2 + 4.k + 1 = 4(\underbrace{k^2 + k}_{\text{nombre pair}}) + 1$$

Nombre impair

La proposition est fautive \Rightarrow Une contradiction

Alors la formule : $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \text{ est pair} \Rightarrow n \text{ est pair}$ est vraie

2. $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$)

Raisonnement par l'absurde, Supposons $\sqrt{2}$ est un nombre rationnel ($\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$)

On sait que les nombres de l'ensemble \mathbb{Q} s'écrivent a/b

Telle que le $\text{pgcd}(a,b) = 1$ (i.e. : a et b sont premiers entre eux), $a, b \in \mathbb{N}^2$

Donc $\sqrt{2} = a/b$ avec $\text{pgcd}(a,b) = 1$

$$(\sqrt{2})^2 = (a/b)^2 \Rightarrow a^2 = 2.b^2$$

\Rightarrow Donc a^2 est un nombre pair \Rightarrow

$$a^2 = 2.b^2 \dots\dots\dots(1)$$

Puisque a est un nombre pair $\Rightarrow a = 2.k$

$$a \text{ pair} \dots\dots\dots(2)$$

\Rightarrow Donc $a^2 = (2.k)^2 = 4.k^2 \Rightarrow$

$$a^2 = 4.k^2 \dots\dots\dots(3)$$

(3) dans (1) $\Rightarrow a^2 = 2.b^2 = 4.k^2$

$\Leftrightarrow b^2 = 2.k^2 \Rightarrow b^2$ est pair $\Leftrightarrow b$ est pair

b pair.....(4)

De (2) et (4) \Rightarrow Les nombres a, b se divisent par deux, ce qui nous ramène à une contradiction, puisque $\text{pgcd}(a, b) = 1 \Rightarrow$ Alors $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$

Donc : $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel est vraie.

Chapitre III:

Applications et Relations binaires

Rappel de Cours

Les Applications

Définition :

Soient E et F deux ensembles quelconques et $f : E \rightarrow F$ une application

- **Application Injective :** Nous disons que f est une application **injective** ou est une **injection** si deux éléments quelconques de E ayant même image par f sont nécessairement égaux, c'est-à-dire: $\forall x, x' \in E, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$
- **Application Surjective:** Nous disons que f est une application **surjective** ou est une **surjection** si tout élément y de F possède au moins un antécédent par f , c'est-à-dire :

$$\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x) \Rightarrow \text{On peut écrire } x \text{ en fonction de } y \\ \Rightarrow x = f^{-1}(y)$$

Application Bijective : Nous disons que f est une application **bijective** ou est une **bijection** si elle est à la fois injective et surjective.

Les Relations binaires

Relation d'équivalence: Pour que la relation soit une Relation d'équivalence, il faut satisfaire les conditions suivantes :

- Réfléxive $\forall x \in E : x \mathfrak{R} x$
- Symétrique $\forall x, y \in E^2 : x \mathfrak{R} y \Rightarrow y \mathfrak{R} x$
- Transitive $\forall x, y \text{ et } z \in E^3 : \begin{cases} x \mathfrak{R} y \\ y \mathfrak{R} z \end{cases} \Rightarrow x \mathfrak{R} z$

Relation d'ordre : Pour que la relation soit une Relation d'équivalence, il faut satisfaire les conditions suivantes :

- Réfléxive $\forall x \in E : x \mathfrak{R} x$
- Anti- Symétrique $\forall x, y \in E^2 : x \mathfrak{R} y \text{ et } y \mathfrak{R} x \Rightarrow x = y$
- Transitive $\forall x, y \text{ et } z \in E^3 : \begin{cases} x \mathfrak{R} y \\ y \mathfrak{R} z \end{cases} \Rightarrow x \mathfrak{R} z$

Série de TD N°03

Les Applications

Exercice 01 : Soient f et g deux applications définies de \mathbb{N} dans \mathbb{N} par :

$$f(x) = 2x \quad , \quad g(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{si } x \text{ est pair} \\ \frac{x-1}{2} & \text{si } x \text{ est impair} \end{cases}$$

- a) Est-ce que f , g sont surjectives ? Injectives ?
- b) Calculer $f \circ g$, $g \circ f$

Exercice 02 : Soient f et g deux applications définies de \mathbb{R} dans \mathbb{R} par :

$$f(x) = 3x + 5 \quad , \quad g(x) = \frac{1}{2}x - 1$$

- a) Montrer que f , g sont des applications bijectives.
- b) Calculer les applications suivantes : f^{-1} , g^{-1} , $(f^{-1} \circ g^{-1})$, $(g^{-1} \circ f^{-1})$
- c) Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ sont des applications bijectives.
- d) Vérifier que : $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$ et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Exercice 03 : Soit f une application définie par :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) = |x| + 2x$$

1. Montrer que f est bijective.
2. Déterminer l'application réciproque f^{-1} .

Les Relations binaires

Exercice 04: Soit \mathfrak{R} une relation définie dans Z par :

$$\forall (x, y) \in Z^2 : x \mathfrak{R} y \Leftrightarrow (x - y) \text{ est un multiple de } 5.$$

- Montrer que \mathfrak{R} est une relation d'équivalence.
- Trouver l'ensemble quotient $Z / 5Z$.

Exercice 05 : On définit sur \mathbb{R}^2 la relation ρ ,

$$(x, y) \rho (x', y') \Leftrightarrow x + y = x' + y'$$

- Montrer que ρ est une relation d'équivalence.
- Trouver la classe d'équivalence du couple $(0,0)$.

Exercice 06 :

- Soit \mathfrak{R} une relation dans IR^* définie par :

$$x \mathfrak{R} y \Leftrightarrow x \cdot y > 0$$

- Montrer que \mathfrak{R} est une relation d'équivalence.
- Calculer l'ensemble des classes d'équivalence.

- Soit \mathfrak{R}' une autre relation dans IR définie par :

$$x \mathfrak{R}' y \Leftrightarrow x \cdot y > 0$$

Montrer que \mathfrak{R}' n'est pas une relation d'équivalence.

Exercice 07 : Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^3 - 3x + 2$ et soit S la relation dans \mathbb{R} définie par :

$$x S y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$$

Montrer que S est une relation d'équivalence.

Exercice 08: Soit \mathfrak{R} une relation dans IR définie comme suit :

$$a \mathfrak{R} b \Leftrightarrow a^3 - b^3 \geq 0$$

- Montrer que \mathfrak{R} est une relation d'ordre.
- Cette relation, est-elle d'ordre total ?

Exercice 09: Soit dans \mathbb{R}^2 la relation définie par

$$(x, y) S (x', y') \Leftrightarrow x \leq x' \text{ et } y \leq y'.$$

Montrer qu'il s'agit d'une relation d'ordre. L'ordre est-il total ?

Corrigé type de la Série de TD N°03

Les Applications

Exercice 01 : Soient f et g deux applications définies de \mathbb{N} dans \mathbb{N} par :

$$f(x) = 2x \quad , \quad g(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{si } x \text{ est pair} \\ \frac{x-1}{2} & \text{si } x \text{ est impair} \end{cases}$$

a) **La surjectivité** de f, g : $\forall y \in \mathbb{N}, \exists x \in \mathbb{N}, y = h(x)$

* $y = f(x) = 2x \Rightarrow x = y/2 \notin \mathbb{N}$ (Donc $f(x)$ n'est pas surjective).

$$* \quad y = g(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{si } x \text{ est pair} \\ \frac{x-1}{2} & \text{si } x \text{ est impair} \end{cases} \Rightarrow x = \begin{cases} 2y \\ 2y+1 \end{cases} \in \mathbb{N}$$

Alors $g(x)$ est surjective.

L'injectivité de f, g : $\forall x, x' \in \mathbb{N}^2, h(x) = h(x') \Rightarrow x = x'$

* $f(x) = f(x') \Leftrightarrow 2x = 2x' \Rightarrow x = x'$: $f(x)$ est une fonction Injective.

$$* \quad g(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{si } x \text{ est pair} \\ \frac{x-1}{2} & \text{si } x \text{ est impair} \end{cases} : \quad g(x) \text{ n'est pas une fonction Injective.}$$

Puisque si : $x=4, x'=5$ et $g(x=4) = g(x=5) = 2 \ll h(x) = h(x') \text{ mais } x \neq x' \gg$

b) Calcul de $f \circ g, g \circ f$

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = \begin{cases} x & \text{si } x \text{ est pair} \\ x-1 & \text{si } x \text{ est impair} \end{cases}$$

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = \begin{cases} x & \text{si } x \text{ est pair} \\ \frac{2x-1}{2} & \text{si } x \text{ est impair} \end{cases}$$

Les Relations binaires

Exercice 04: Soit \mathfrak{R} une relation définie dans Z par :

$$\forall (x, y) \in Z^2 : x \mathfrak{R} y \Leftrightarrow (x - y) \text{ est un multiple de } 5.$$

a) Montrons que \mathfrak{R} est une relation d'équivalence.

Relation d'équivalence:

Réflexive: Soit $x \in Z$ $x - x = 5k \Leftrightarrow 0 = 5k$ Donc $x \mathfrak{R} x$

symétrique: Soient $x, y \in Z^2$:

$$x \mathfrak{R} y : x - y = 5k, \text{ multiplions par } -1 \Rightarrow y - x = 5k' \text{ Donc } y \mathfrak{R} x$$

$$\text{Transitive: } \begin{cases} x \mathfrak{R} y : x - y = 5k \dots \dots \dots (1) \\ y \mathfrak{R} z : y - z = 5k' \dots \dots \dots (2) \end{cases}$$

$$(1) + (2) \Rightarrow x - z = 5k'' \quad \text{Donc } x \mathfrak{R} z$$

b) L'ensemble quotient $Z / 5Z$.

$$x = \{y \in Z \mid y \mathfrak{R} x\} \Rightarrow x - y = 5k \Rightarrow y = 5k + x \quad (k \in Z)$$

$$0 = \{y \in Z \mid y \mathfrak{R} 0\} \Rightarrow y - 0 = 5k \Rightarrow y = 5k$$

$$1 = \{y \in Z \mid y \mathfrak{R} 1\} \Rightarrow y - 1 = 5k \Rightarrow y = 5k + 1$$

$$2 = \{y \in Z \mid y \mathfrak{R} 2\} \Rightarrow y - 2 = 5k \Rightarrow y = 5k + 2$$

$$3 = \{y \in Z \mid y \mathfrak{R} 3\} \Rightarrow y - 0 = 5k \Rightarrow y = 5k + 3$$

$$4 = \{y \in Z \mid y \mathfrak{R} 4\} \Rightarrow y - 0 = 5k \Rightarrow y = 5k + 4$$

$$0 = 5 = 10 = \dots, \quad 1 = 6 = 11 = \dots, \quad 2 = 7 = 12 = 17 = \dots, \quad 3 = 8 = 13 = 18 = \dots, \quad 4 = 9 = 14 = 19 = \dots,$$

Exercice 05 : On définit sur \mathbb{R}^2 la relation ρ , $(x, y)\rho(x', y') \Leftrightarrow x + y = x' + y'$

1) Montrons que ρ est une relation d'équivalence.

$$(x, y)\rho(x', y') \Leftrightarrow x + y = x' + y'$$

Relation d'équivalence :

Réflexive: Soit $x \in R$ $x + y = x + y$ Donc $x \mathfrak{R} y$

symétrique: Soient $x, y \in R^2$:

$$(x, y)\mathfrak{R}(x', y') : x + y = x' + y' \Leftrightarrow x' + y' = x + y \text{ Donc } (x', y')\mathfrak{R}(x, y)$$

$$\text{Transitoire: } \begin{cases} (x, y)\mathfrak{R}(x', y') \Leftrightarrow x + y = x' + y' \dots \dots \dots (1) \\ (x', y')\mathfrak{R}(z, u) \Leftrightarrow x' + y' = z + u \dots \dots \dots (2) \end{cases}$$

$$(1) + (2) \Rightarrow x + y = z + u \quad \text{Donc } (x, y)\mathfrak{R}(z, u)$$

2) La classe d'équivalence du couple (0,0) .

Chapitre IV:

Les Fonctions réelles à une variable réelle

Rappel de Cours

Domaine de définition:

| | | |
|---|---|--|
| 1) $\text{Arc sin}(x)$ | définie sur | $[-1,1]$ |
| 2) $\text{Arc cos}(x)$ | définie sur | $[-1,1]$ |
| 3) $\text{Arctg}(x)$ | définie sur | $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ |
| 4) $\text{Argsh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$ | définie sur | \mathfrak{R} |
| 5) $\text{Argch}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)$ | définie sur | $[1, +\infty[$ |
| 6) $\text{Argth}(x) = \ln\left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\right)$ | définie sur | $] -1, 1[$ |
| 7) $\text{Sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ | $\text{Ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ | $\text{Th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ |

Les limites:

| | | |
|---|---|---|
| 1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ | 2) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$ | 3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$ |
| 4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(x)}{x} = 1$ | 5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 1$ | 6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ |
| 7) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$ | 8) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ | 9) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$ |
| 10) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ | 11) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$ | 12) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$ |

La continuité d'une fonction :

$$\lim_{x \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

La dérivabilité d'une fonction :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

Note :

Rappel :

Si $f(x)$ est dérivable $\rightarrow f(x)$ est continue
La réciproque n'est pas toujours valable.

Règle de l'Hôpital :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Théorème des accroissements finis

Soit f une application de l'intervalle $]a, b[$ dans \mathbf{R} vérifiant les conditions suivantes :

1. f est continue sur $]a, b[$,
2. f est dérivable sur $]a, b[$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$

Théorème de Rolle

Théorème (de Rolle) :

Soit f une fonction numérique continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(a) = f(b)$

Alors, il existe un point c de $]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Développement de Maclaurin

Définition : On appelle **polynôme de Maclaurin** d'une fonction $f(x)$ qui admet des dérivées de tous ordres en $x = 0$ l'expression :

$$m_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

où $f^{(k)}(0)$ exprime la $k^{\text{ième}}$ dérivée de f évaluée en $x = 0$.

On appelle **polynôme de Taylor** d'une fonction $f(x)$ qui admet des dérivées de tous ordres en $x = a$ l'expression :

$$t_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k$$

où $f^{(k)}(a)$ exprime la $k^{\text{ième}}$ dérivée de f évaluée en $x = a$.

Série de TD N°04

Les Fonctions

Exercice 01 : Donner le domaine de définition des fonctions suivantes :

$$1) f(x) = \ln(\sqrt{1-x^2})$$

$$2) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{2-x}}$$

$$3) f(x) = x^x$$

$$4) f(x) = \text{Arcsin}(1-x^2)$$

$$5) f(x) = \sqrt{-x} + \frac{1}{\sqrt{1-x}}$$

$$6) f(x) = \sqrt{\cos(2x)}$$

$$7) f(x) = \sqrt{\text{tg}(x)}$$

$$8) f(x) = \log\left(\frac{1+x}{3-x}\right)$$

$$9) f(x) = \text{th}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)$$

$$10) f(x) = \text{arctg}\left(\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\right)$$

$$11) f(x) = \text{argsh}(3x+2)$$

$$12) f(x) = \text{argth}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$$

Exercice 02 : calculer les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{1-x}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{1-x} - \frac{3}{1-x^3}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{2x^2-1} - \frac{x^2}{2x+1}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x(x-2)^2} - \frac{1}{x^2-3x+2}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(2x)}{x}$$

$$6) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin(x)}{\left(\frac{\pi}{2}-x\right)^2}$$

$$7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+a^2}-a}{\sqrt{x^2+b^2}-b}$$

$$8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt[3]{x+1}-1}$$

$$9) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \log \frac{(e^x-1)}{x}$$

$$10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(x)}{1-\cos(x)}$$

$$11) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}$$

$$12) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - \sin(2x)}{x^2}$$

$$13) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-e^{-x}}{\sin(x)}$$

$$14) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{|x|}$$

$$15) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{\sqrt{1-\cos(x)}}$$

$$16) \lim_{x \rightarrow 0} \log \frac{(e^x-1)}{x}$$

Exercice 03 : Etudier la **continuité** des fonctions suivantes :

$$01) f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq 2 \\ 5 - x & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$02) f(x) = \begin{cases} -2x - 3 & \text{si } x \leq -1 \\ x & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ -3x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$03) f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ -x^2 + 4x - 2 & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ 4 - x & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

$$04) f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$05) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 3 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

$$06) f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 0 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Exercice 04 : Peut-on **prolonger par la continuité** (au point $x_0 = 0$) les fonctions suivantes :

$$\bullet f(x) = \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}}$$

$$\bullet f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

$$\bullet f(x) = x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\bullet f(x) = \frac{1}{x} \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\bullet f(x) = \frac{1}{x^2} e^{\left(\frac{-1}{x^2}\right)}$$

$$\bullet f(x) = (1 + x)^{\frac{1}{x}}$$

Exercice 05 : Etudier la **continuité et la dérivabilité** des fonctions suivantes

$$f(x) = \begin{cases} x^2 e^{-x^2} & \text{si } |x| \leq 1 \\ \frac{1}{e} & \text{si } |x| > 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x \sin x} - \cos(2x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2 + x|}{x + 1} & \text{si } x \neq -1 \\ -1 & \text{si } x = -1 \end{cases}$$

Exercice 06 : Soit $f(x)$ une fonction définie sur \mathbb{R} par :

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que f est dérivable sur \mathbb{R} et calculer sa fonction dérivée.
2. Ecrire $f'(x)$ sous sa forme prolongée.

Exercice 07 : En utilisant la Règle d'Hôpital, calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x \cos x - \sin x}{x^3} \right)$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1 + \log x}{e^x - e}$
- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)}{1 - 2 \cos x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\alpha x) - \cos(\beta x)}{x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^p}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x \ln(x) - x + 1}{(x-1) \ln(x)} \right)$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos(x)) \cotan(x)$

Exercice 08 :

1- En utilisant le théorème accroissement fini, montrer que :

- * $\forall x, y \in \mathbb{R} ; |\sin x - \sin y| \leq |x - y|$
- * $\forall x \in \mathbb{R}^+ ; 0 \leq \log(1+x) < x$
- * $\forall x \in \mathbb{R} : e^x > 1+x$
- * $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x+1) \cdot e^{\frac{1}{x+1}} - x \cdot e^{\frac{1}{x}} \right] = 1$
- * Pour tout $0 < \alpha < 1$, et $i \in \mathbb{N} : \frac{\alpha}{(i+1)^{1-\alpha}} \leq (i+1)^\alpha - i^\alpha \leq \frac{\alpha}{i^{1-\alpha}}$
- * $\forall x \in \mathbb{R}^+ ; \frac{x}{x^2+1} \leq \text{Arctg}(x) \leq x$
- * $0 \leq x < 1 ; x \leq \text{Arc sin}(x) \leq \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ tq: $\text{Arc sin}(x) \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$
- * $\forall x \in \mathbb{R}^+ ; \frac{1}{x+1} < \log(1+x) - \log(x) < x$
- * $\forall x \in \mathbb{R} : |\sin(x)| \leq |x|$
- * $\forall x \in \mathbb{R} : 0 \leq \text{Arctg}(x+1) - \text{Arctg}(x) \leq 1$

2- a) En utilisant le **théorème des valeurs intermédiaires** montrer que l'équation $xe^{\sin x} = \cos x$

Admet au moins une solution dans $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

b) Par le **théorème de Rolle**, montrer que cette solution est unique

Exercice 09 : Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer le domaine de définition et calculer la **dérivée** :

$$f_1(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 1})$$

$$f_2(x) = \sqrt{1 + x^2 \cos^2(x)}$$

$$f_3(x) = \frac{\exp\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$f_4(x) = \ln\left(\frac{1 + \sin(x)}{1 - \sin(x)}\right)$$

$$f_5(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$f_6(x) = \frac{\sin(x^3 + 1)}{\cos(2x + 1)}$$

Exercice 10 :

1-Calculer les dérivées n^{ièmes} des fonctions :

$$f(x) = xe^x$$

$$f(x) = \frac{1}{1-x}$$

$$f(x) = x^2 \sin x$$

2-Montrer que la dérivée n^{ième} de la fonction f(x) :

$$f :]-1,1[\rightarrow \mathbb{R} \text{ définie par } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$s'écrit \quad f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1-x^2)^{n+\frac{1}{2}}}, \forall x \in]-1,1[\text{ ou } P_n(x) \text{ est le polynôme de degré } n$$

Exercice 11 :

1- En utilisant le **Développement de Mac Laurin**, donner le développement des fonctions suivantes :

$$f(x) = \sin x$$

$$f(x) = \cos x$$

$$f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$$

$$f(x) = e^x$$

2- Calculer \sqrt{e} avec 3 chiffres exacts en utilisant le D de Mac Laurin

En utilisant le **développement limité** quand $x \rightarrow 0$. Calculer les fonctions suivantes

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$$

$$h(x) = \frac{\sin x - \operatorname{tg} x}{x(\cos x - 1)}$$

$$g(x) = \frac{e^x \sin x - x}{3x^2 + x^5}$$

Corrigé type de la Série de TD N°04

Exercice 01: Domaine de définition:

$$1) f(x) = \ln(\sqrt{1-x^2}) \Rightarrow 1-x^2 > 0 \Leftrightarrow x \in]-1,1[$$

$$2) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{2-x}} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ \sqrt{x} + \sqrt{2-x} \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow x \in [0,2]$$

$$3) f(x) = x^x = e^{\ln(x^x)} = e^{x \ln(x)} \Rightarrow x > 0 \Leftrightarrow x \in]0, +\infty[$$


$$4) f(x) = \text{Arc sin}(1-x^2) \Rightarrow -1 \leq 1-x^2 \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x^2 - 1 \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq x^2 \leq 2 \Leftrightarrow x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$$

$$5) f(x) = \sqrt{-x} + \frac{1}{\sqrt{1-x}} \Rightarrow \begin{cases} -x \geq 0 \\ 1-x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 0 \\ x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow x \in]-\infty, 0]$$

$$6) f(x) = \sqrt{\cos(2x)} \Rightarrow \cos(2x) \geq 0 \Rightarrow \frac{-\pi}{2} \leq 2x \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{-\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \Rightarrow x \in \left[\frac{-\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{4} + k\pi \right]$$

$$7) f(x) = \sqrt{\text{tg}(x)} = \sqrt{\frac{\sin(x)}{\cos(x)}} \Rightarrow \begin{cases} \sin(x) \cdot \cos(x) \geq 0 \\ \cos(x) \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin(x) \geq 0 \text{ et } \cos(x) > 0 \\ \text{Ou} \\ \sin(x) \leq 0 \text{ et } \cos(x) < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x \in [0, \pi/2[\cup]\pi, 3\pi/2[$$



Alors le domaine de définition est $\Rightarrow x \in]0, \frac{\pi}{2}] \cup]\pi, \frac{3\pi}{2}[$

Une autre méthode pour trouver le domaine de définition :

Puisque $\begin{cases} \sin(x) \cdot \cos(x) \geq 0 \\ \cos(x) \neq 0 \end{cases}$

| | 0 | $\pi / 2$ | π | $3\pi / 2$ | 2π | |
|-----------------------------|---|-----------|-------|------------|--------|---|
| Cos(x) | | + | ○ | - | ○ | + |
| Sin(x) | ○ | + | + | ○ | - | - |
| $\sin(x) \cdot \cos(x) > 0$ | | + | - | + | - | |

Alors le domaine de définition est $\Rightarrow x \in]0, \frac{\pi}{2}] \cup]\pi, \frac{3\pi}{2}[$

$$8) f(x) = \log\left(\frac{1+x}{3-x}\right) \Rightarrow (1+x)(3-x) > 0 \Rightarrow x \in]-1, 3[$$

$$9) f(x) = \operatorname{th}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right) = \frac{e^{\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)} - e^{-\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)}}{e^{\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)} + e^{-\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)}} \Rightarrow \begin{cases} e^{\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)} + e^{-\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)} \neq 0 \\ x^2 + 1 \neq 0 \end{cases}$$

les deux conditions sont toujours conclues $\Rightarrow x \in \mathfrak{R}$

Exercice 03 : Etude de la **continuité** des fonctions suivantes :

$$\lim_{x \underset{<}{\overset{>}{\rightarrow}} a} f(x) = f(a)$$

$$1) f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq 2 \\ 5 - x & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Domaine de définition \mathfrak{R} ,

Par l'application de la règle de continuité, on trouve que :

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{x \underset{>}{\rightarrow} 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (5 - x) = 3 \\ \lim_{x \underset{<}{\rightarrow} 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (2^2 - 1) = 3 \\ f(2) = (2^2 - 1) = 3 \end{cases}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = 3$, Alors $f(x)$ est continue au $x_0 = 2$

$$2) f(x) = \begin{cases} -2x - 3 & \text{si } x \leq -1 \\ x & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ -3x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Domaine de définition \mathfrak{R} ,

Par l'application de la règle de continuité, on trouve que :

Pour $x_0 = -1$:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (x) = -1 \\ f(-1) = (-2(-1) - 3) = -1 \end{cases}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$, Alors $f(x)$ est continue au $x_0 = -1$

Pour $x_0 = +1$:

$$\lim_{x \rightarrow +1} f(x) = f(+1) \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +1} f(x) = \lim_{x \rightarrow +1} (3x) = 3 \\ f(+1) = (+1) = +1 \end{cases}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow +1} f(x) \neq f(+1)$, Alors $f(x)$ n'est pas continue au $x_1 = +1$

Exercice 11 :

Rappel :

Définition : On appelle **polynôme de Maclaurin** d'une fonction $f(x)$ qui admet des dérivées de tous ordres en $x = 0$ l'expression :

$$m_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

où $f^{(k)}(0)$ exprime la $k^{\text{jème}}$ dérivée de f évaluée en $x = 0$.

On appelle **polynôme de Taylor** d'une fonction $f(x)$ qui admet des dérivées de tous ordres en $x = a$ l'expression :

$$t_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k$$

où $f^{(k)}(a)$ exprime la $k^{\text{jème}}$ dérivée de f évaluée en $x = a$.

1-En utilisant le Développement de Mac Laurin, donner le développement des fonctions suivantes :

1) $f(x) = \sin(x)$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = \sin(x) \\ f^{(1)}(x) = +\cos(x) \\ f^{(2)}(x) = -\sin(x) \\ f^{(3)}(x) = -\cos(x) \\ f^{(4)}(x) = +\sin(x) \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f(0) = 0 \\ f^{(1)}(0) = +1 \\ f^{(2)}(0) = 0 \\ f^{(3)}(0) = -1 \\ f^{(4)}(0) = 0 \end{array} \right. \Rightarrow f(x) = \sin(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = \frac{f^{(0)}(0)}{0!} x^0 + \frac{f^{(1)}(0)}{1!} x^1 + \frac{f^{(2)}(0)}{2!} x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!} x^3 + \dots \\ f(x) = \sin(x) = x - \frac{1}{3!} x^3 + \dots \end{array} \right.$$

2) $f(x) = \cos(x)$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = \cos(x) \\ f^{(1)}(x) = -\sin(x) \\ f^{(2)}(x) = -\cos(x) \\ f^{(3)}(x) = +\sin(x) \\ f^{(4)}(x) = +\cos(x) \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f(0) = +1 \\ f^{(1)}(0) = 0 \\ f^{(2)}(0) = -1 \\ f^{(3)}(0) = 0 \\ f^{(4)}(0) = 1 \end{array} \right. \Rightarrow f(x) = \cos(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f(x) = \frac{f^{(0)}(0)}{0!} x^0 + \frac{f^{(1)}(0)}{1!} x^1 + \frac{f^{(2)}(0)}{2!} x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!} x^3 + \dots \\ f(x) = \cos(x) = 1 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 \dots \end{array} \right.$$

Annexe:

Lois Algébriques

Développements limités usuels en 0

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + O(x^{n+1})$$

$$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + O(x^{2n+3})$$

$$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + O(x^{2n+2})$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + O(x^{2n+3})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + O(x^{2n+2})$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + O(x^{n+1})$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + O(x^{n+1})$$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \cdots - \frac{x^n}{n} + O(x^{n+1})$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + O(x^{n+1})$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + O(x^{n+1})$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-3)}{2 \times 4 \times \cdots \times 2n} x^n + O(x^{n+1})$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2 - \cdots + (-1)^n \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots \times 2n} x^n + O(x^{n+1})$$

$$\operatorname{Arctan} x = x - \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + O(x^{2n+3})$$

$$\operatorname{Argth} x = x + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + O(x^{2n+3})$$

$$\operatorname{Arcsin} x = x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots \times 2n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + O(x^{2n+3})$$

$$\operatorname{Argsh} x = x - \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots \times 2n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + O(x^{2n+3})$$

$$\operatorname{th} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 - \frac{17}{315}x^7 + O(x^9)$$

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + O(x^9)$$

Développements en série entière usuels

$$e^{ax} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} x^n \quad a \in \mathbb{C}, x \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{sh} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{ch} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n} \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \quad x \in \mathbb{R}$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n \quad (\alpha \in \mathbb{R}) \quad x \in]-1; 1[$$

$$\frac{1}{a-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{a^{n+1}} x^n \quad (a \in \mathbb{C}^*) \quad x \in]-|a|; |a|[$$

$$\frac{1}{(a-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{a^{n+2}} x^n \quad (a \in \mathbb{C}^*) \quad x \in]-|a|; |a|[$$

$$\frac{1}{(a-x)^k} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_{n+k-1}^{k-1}}{a^{n+k}} x^n \quad (a \in \mathbb{C}^*) \quad x \in]-|a|; |a|[$$

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n \quad x \in]-1; 1[$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad x \in]-1; 1]$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-3)}{2 \times 4 \times \cdots \times (2n)} x^n \quad x \in]-1; 1[$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots \times (2n)} x^n \quad x \in]-1; 1[$$

$$\operatorname{Arctan} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad x \in]-1; 1]$$

$$\operatorname{Argth} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \quad x \in]-1; 1[$$

$$\operatorname{Arcsin} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots \times (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad x \in]-1; 1[$$

$$\operatorname{Argsh} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots \times (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad x \in]-1; 1[$$

Dérivées usuelles

| Fonction | | Dérivée | Dérivabilité |
|---------------------------|--|--|--|
| x^n | $n \in \mathbb{Z}$ | nx^{n-1} | \mathbb{R}^* |
| x^α | $\alpha \in \mathbb{R}$ | $\alpha x^{\alpha-1}$ | \mathbb{R}_+^* |
| $e^{\alpha x}$ | $\alpha \in \mathbb{C}$ | $\alpha e^{\alpha x}$ | \mathbb{R} |
| a^x | $a \in \mathbb{R}_+^*$ | $a^x \ln a$ | \mathbb{R} |
| $\ln x $ | | $\frac{1}{x}$ | \mathbb{R}^* |
| $\log_a x$ | $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ | $\frac{1}{x \ln a}$ | \mathbb{R}^* |
| $\cos x$ | | $-\sin x$ | \mathbb{R} |
| $\sin x$ | | $\cos x$ | \mathbb{R} |
| $\tan x$ | | $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ | $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ |
| $\cotan x$ | | $-1 - \cotan^2 x = \frac{-1}{\sin^2 x}$ | $\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ |
| $\operatorname{ch} x$ | | $\operatorname{sh} x$ | \mathbb{R} |
| $\operatorname{sh} x$ | | $\operatorname{ch} x$ | \mathbb{R} |
| $\operatorname{th} x$ | | $1 - \operatorname{th}^2 x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$ | \mathbb{R} |
| $\operatorname{coth} x$ | | $1 - \operatorname{coth}^2 x = \frac{-1}{\operatorname{sh}^2 x}$ | \mathbb{R}^* |
| $\operatorname{Arcsin} x$ | | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ | $] -1; 1 [$ |
| $\operatorname{Arccos} x$ | | $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$ | $] -1; 1 [$ |
| $\operatorname{Arctan} x$ | | $\frac{1}{1+x^2}$ | \mathbb{R} |
| $\operatorname{Argsh} x$ | | $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ | \mathbb{R} |
| $\operatorname{Argch} x$ | | $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ | $] 1; +\infty [$ |
| $\operatorname{Argth} x$ | | $\frac{1}{1-x^2}$ | $] -1; 1 [$ |

Primitives usuelles

I Polynômes et fractions simples

| Fonction | Primitive | Intervalles |
|--|--|---|
| $(x - x_0)^n$ $x_0 \in \mathbb{R}$ $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$ | $\frac{(x - x_0)^{n+1}}{n + 1}$ | $n \in \mathbb{N} : x \in \mathbb{R}$ $n \in \mathbb{Z} \setminus (\mathbb{N} \cup \{-1\}) :$ $x \in] -\infty ; x_0 [,] x_0 ; +\infty [$ |
| $(x - x_0)^\alpha$ $x_0 \in \mathbb{R}$ $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{-1\}$ | $\frac{(x - x_0)^{\alpha+1}}{\alpha + 1}$ | $] x_0 ; +\infty [$ |
| $(x - z_0)^n$ $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$ | $\frac{(x - z_0)^{n+1}}{n + 1}$ | \mathbb{R} |
| $\frac{1}{x - a}$ $a \in \mathbb{R}$ | $\ln x - a $ | $] -\infty ; a [,] a ; +\infty [$ |
| $\frac{1}{x - (a + ib)}$ $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}^*$ | $\frac{1}{2} \ln [(x - a)^2 + b^2]$ $+ i \operatorname{Arctan} \frac{x - a}{b}$ | \mathbb{R} |

II Fonctions usuelles

| Fonction | Primitive | Intervalles |
|--|---------------------------------|--|
| $\ln x$ | $x(\ln x - 1)$ | $] 0 ; +\infty [$ |
| $e^{\alpha x}$ $\alpha \in \mathbb{C}^*$ | $\frac{1}{\alpha} e^{\alpha x}$ | \mathbb{R} |
| $\sin x$ | $-\cos x$ | \mathbb{R} |
| $\cos x$ | $\sin x$ | \mathbb{R} |
| $\tan x$ | $-\ln \cos x $ | $] -\frac{\pi}{2} + k\pi ; \frac{\pi}{2} + k\pi [$ |
| $\cotan x$ | $\ln \sin x $ | $] k\pi ; (k + 1)\pi [$ |
| $\operatorname{sh} x$ | $\operatorname{ch} x$ | \mathbb{R} |
| $\operatorname{ch} x$ | $\operatorname{sh} x$ | \mathbb{R} |
| $\operatorname{th} x$ | $\ln(\operatorname{ch} x)$ | \mathbb{R} |
| $\operatorname{coth} x$ | $\ln \operatorname{sh} x $ | $] -\infty ; 0 [,] 0 ; +\infty [$ |

III Puissances et inverses de fonctions usuelles

| Fonction | Primitive | Intervalles |
|---|--|--|
| $\sin^2 x$ | $\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$ | \mathbb{R} |
| $\cos^2 x$ | $\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$ | \mathbb{R} |
| $\tan^2 x$ | $\tan x - x$ | $]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi [$ |
| $\cotan^2 x$ | $-\cotan x - x$ | $]k\pi; (k+1)\pi [$ |
| $\operatorname{sh}^2 x$ | $\frac{\operatorname{sh} 2x}{4} - \frac{x}{2}$ | \mathbb{R} |
| $\operatorname{ch}^2 x$ | $\frac{\operatorname{sh} 2x}{4} + \frac{x}{2}$ | \mathbb{R} |
| $\operatorname{th}^2 x$ | $x - \operatorname{th} x$ | \mathbb{R} |
| $\operatorname{coth}^2 x$ | $x - \operatorname{coth} x$ | $]-\infty; 0 [,] 0; +\infty [$ |
| $\frac{1}{\sin x}$ | $\ln \left \tan \frac{x}{2} \right $ | $]k\pi; (k+1)\pi [$ |
| $\frac{1}{\cos x}$ | $\ln \left \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right $ | $]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi [$ |
| $\frac{1}{\operatorname{sh} x}$ | $\ln \left \operatorname{th} \frac{x}{2} \right $ | $]-\infty; 0 [,] 0; +\infty [$ |
| $\frac{1}{\operatorname{ch} x}$ | $2 \operatorname{Arctan} e^x$ | \mathbb{R} |
| $\frac{1}{\sin^2 x} = 1 + \cotan^2 x$ | $-\cotan x$ | $]k\pi; (k+1)\pi [$ |
| $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$ | $\tan x$ | $]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi [$ |
| $\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x} = \operatorname{coth}^2 x - 1$ | $-\operatorname{coth} x$ | $]-\infty; 0 [,] 0; +\infty [$ |
| $\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} = 1 - \operatorname{th}^2 x$ | $\operatorname{th} x$ | \mathbb{R} |
| $\frac{1}{\sin^4 x}$ | $-\cotan x - \frac{\cotan^3 x}{3}$ | $]k\pi; (k+1)\pi [$ |
| $\frac{1}{\cos^4 x}$ | $\tan x + \frac{\tan^3 x}{3}$ | $]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi [$ |

IV Fonctions dérivées de fonctions réciproques

| Fonction | | Primitive | Intervalles |
|----------------------------|----------------------|--|--|
| $\frac{1}{1+x^2}$ | | $\text{Arctan } x$ | \mathbb{R} |
| $\frac{1}{a^2+x^2}$ | $a \in \mathbb{R}^*$ | $\frac{1}{a} \text{Arctan } \frac{x}{a}$ | \mathbb{R} |
| $\frac{1}{1-x^2}$ | | $\begin{cases} \text{Argth } x \\ \frac{1}{2} \ln \left \frac{1+x}{1-x} \right \end{cases}$ | $\begin{cases}]-1; 1[\\]-\infty; -1[, \\]-1; 1[,]1; +\infty[\end{cases}$ |
| $\frac{1}{a^2-x^2}$ | $a \in \mathbb{R}^*$ | $\begin{cases} \frac{1}{a} \text{Argth } \frac{x}{a} \\ \frac{1}{2a} \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right \end{cases}$ | $\begin{cases}]- a ; a [\\]-\infty; - a [, \\]- a ; a [,] a ; +\infty[\end{cases}$ |
| $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ | | $\text{Arcsin } x$ | $] -1; 1 [$ |
| $\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$ | $a \in \mathbb{R}^*$ | $\text{Arcsin } \frac{x}{ a }$ | $] - a ; a [$ |
| $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ | | $\text{Argsh } x = \frac{\ln(x + \sqrt{x^2+1})}{1}$ | \mathbb{R} |
| $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ | | $\begin{cases} \text{Argch } x \\ -\text{Argch } (-x) \\ \ln x + \sqrt{x^2-1} \end{cases}$ | $\begin{cases}]1; +\infty[\\]-\infty; -1[\\]-\infty; -1[\text{ ou }]1; +\infty[\end{cases}$ |
| $\frac{1}{\sqrt{x^2+a}}$ | $a \in \mathbb{R}^*$ | $\ln x + \sqrt{x^2+a} $ | $\begin{cases} a > 0 : \mathbb{R} \\ a < 0 : \\]-\infty; -\sqrt{-a}[\\ \text{ou }]\sqrt{a}; +\infty[\end{cases}$ |
| $\frac{1}{(x^2+1)^2}$ | | $\frac{1}{2} \text{Arctan } x + \frac{x}{2(x^2+1)}$ | \mathbb{R} |
| $\frac{x^2}{(x^2+1)^2}$ | | $\frac{1}{2} \text{Arctan } x - \frac{x}{2(x^2+1)}$ | \mathbb{R} |



Trigonométrie

I Fonctions circulaires

1 Premières propriétés

| | $\sin x$ | $\cos x$ | $\tan x$ | $\cotan x$ |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--|---|
| Ensemble de définition | \mathbb{R} | \mathbb{R} | $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ | $\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ |
| Période | 2π | 2π | π | π |
| Parité | impaire | paire | impaire | impaire |
| $f(\pi - x)$ | $\sin x$ | $-\cos x$ | $-\tan x$ | $-\cotan x$ |
| $f(\pi + x)$ | $-\sin x$ | $-\cos x$ | $\tan x$ | $\cotan x$ |
| $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ | $\cos x$ | $\sin x$ | $\cotan x$ | $\tan x$ |
| $f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ | $\cos x$ | $-\sin x$ | $-\cotan x$ | $-\tan x$ |
| Ensemble de dérivabilité | \mathbb{R} | \mathbb{R} | $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ | $\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ |
| Dérivée | $\cos x$ | $-\sin x$ | $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ | $-1 - \cotan^2 x = \frac{-1}{\sin^2 x}$ |

2 Valeurs remarquables



| | 0 | $\pi/6$ | $\pi/4$ | $\pi/3$ | $\pi/2$ |
|------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| $\sin x$ | 0 | $\sqrt{1}/2$ | $\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{3}/2$ | 1 |
| $\cos x$ | 1 | $\sqrt{3}/2$ | $\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{1}/2$ | 0 |
| $\tan x$ | 0 | $1/\sqrt{3}$ | 1 | $\sqrt{3}$ | indéfini |
| $\cotan x$ | indéfini | $\sqrt{3}$ | 1 | $1/\sqrt{3}$ | 0 |

II Fonctions réciproques des fonctions circulaires

1 Définition

Les périodicités et les symétries des fonctions trigonométriques introduisent une difficulté pour résoudre les équations du type $\sin x = \lambda$. Par exemple, $\pi/6$, $5\pi/6$ et $\pi/6 + 4\pi$ ont tous la même image par la fonction sinus. Les « fonctions circulaires réciproques » Arcsin, Arccos, Arctan et Arccot ne sont pas de vraies réciproques, puisque les fonctions de départ ne sont pas des bijections ; ajoutons qu'elles ne sont *pas* périodiques. Il faut les combiner avec la périodicité et, pour sinus et cosinus, avec les symétries par rapport à l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses respectivement.

- Si $\sin x = \lambda \in [-1; 1]$, alors $x = \text{Arcsin } \lambda \pmod{2\pi}$
ou $x = \pi - \text{Arcsin } \lambda \pmod{2\pi}$
- Si $\cos x = \lambda \in [-1; 1]$, alors $x = \text{Arccos } \lambda \pmod{2\pi}$
ou $x = -\text{Arccos } \lambda \pmod{2\pi}$
- Si $\tan x = \lambda \in \mathbb{R}$, alors $x = \text{Arctan } \lambda \pmod{\pi}$
- Si $\cotan x = \lambda \in \mathbb{R}$, alors $x = \text{Arccot } \lambda \pmod{\pi}$

Le problème réciproque est, lui, sans difficulté : si $x = \text{Arcsin } \lambda$, alors $\sin x = \lambda$.

2 Propriétés

| | Arcsin x | Arccos x | Arctan x | Arccot x |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Ensemble de définition | $[-1; 1]$ | $[-1; 1]$ | \mathbb{R} | \mathbb{R} |
| Ensemble image | $[-\pi/2; \pi/2]$ | $[0; \pi]$ | $] -\pi/2; \pi/2 [$ | $] 0; \pi [$ |
| Période | aucune | aucune | aucune | aucune |
| Parité | impaire | aucune | impaire | aucune |
| Ensemble de dérivabilité | $] -1; 1 [$ | $] -1; 1 [$ | \mathbb{R} | \mathbb{R} |
| Dérivée | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ | $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$ | $\frac{1}{1+x^2}$ | $\frac{-1}{1+x^2}$ |

3 Relations

$$\operatorname{Arccos} x + \operatorname{Arcsin} x = \pi/2$$

$$\operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arctan} y = \operatorname{Arctan} \frac{x+y}{1-xy} + \varepsilon\pi \quad \text{où } \varepsilon = \begin{cases} 0 & \text{si } xy < 1 \\ 1 & \text{si } xy > 1 \text{ et } x, y \geq 0 \\ -1 & \text{si } xy > 1 \text{ et } x, y \leq 0 \end{cases}$$

$$\operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arccot} x = \pi/2$$

$$\operatorname{Arccot} x = \begin{cases} \operatorname{Arctan} 1/x & \text{si } x > 0 \\ \pi + \operatorname{Arctan} 1/x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$\operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arctan} 1/x = \operatorname{sign}(x) \times \pi/2$$

III Formules

1 Corollaires du théorème de Pythagore

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{1 + \cot^2 x} = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$$

2 Addition des arcs

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

$$\tan p + \tan q = \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q}$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$$

$$\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$$

$$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

$$\tan p - \tan q = \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}$$

3 Arc double, arc moitié

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= 2 \cos^2 x - 1 \\ &= 1 - 2 \sin^2 x \end{aligned}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

$$\tan x = \frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = \frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x}$$

En notant $t = \tan \frac{x}{2}$ comme dans les règles de Bioche, on a :

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2} \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

4 Formule de Moivre

$$(\cos a + i \sin a)^n = \cos na + i \sin na$$

d'où

$$\begin{aligned} \cos 3a &= \cos^3 a - 3 \cos a \sin^2 a \\ &= 4 \cos^3 a - 3 \cos a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin 3a &= 3 \cos^2 a \sin a - \sin^3 a \\ &= 3 \sin a - 4 \sin^3 a \end{aligned}$$

$$\tan 3a = \frac{3 \tan a - \tan^3 a}{1 - 3 \tan^2 a}$$

5 Arcs en progression arithmétique

$$\sum_{k=0}^n \sin kx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \qquad \sum_{k=0}^n \cos kx = \frac{\cos \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}$$

IV Trigonométrie hyperbolique

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$

$$\operatorname{ch}(a+b) = \operatorname{ch} a \operatorname{ch} b + \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b \qquad \operatorname{ch} p + \operatorname{ch} q = 2 \operatorname{ch} \frac{p+q}{2} \operatorname{ch} \frac{p-q}{2}$$

$$\operatorname{sh}(a+b) = \operatorname{sh} a \operatorname{ch} b + \operatorname{sh} b \operatorname{ch} a \qquad \operatorname{sh} p + \operatorname{sh} q = 2 \operatorname{sh} \frac{p+q}{2} \operatorname{ch} \frac{p-q}{2}$$

$$\operatorname{th}(a+b) = \frac{\operatorname{th} a + \operatorname{th} b}{1 + \operatorname{th} a \operatorname{th} b} \qquad \operatorname{th} p + \operatorname{th} q = \frac{\operatorname{sh}(p+q)}{\operatorname{ch} p \operatorname{ch} q}$$

$$\operatorname{ch}(a-b) = \operatorname{ch} a \operatorname{ch} b - \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b \qquad \operatorname{ch} p - \operatorname{ch} q = 2 \operatorname{sh} \frac{p+q}{2} \operatorname{sh} \frac{p-q}{2}$$

$$\operatorname{sh}(a-b) = \operatorname{sh} a \operatorname{ch} b - \operatorname{sh} b \operatorname{ch} a \qquad \operatorname{sh} p - \operatorname{sh} q = 2 \operatorname{sh} \frac{p-q}{2} \operatorname{ch} \frac{p+q}{2}$$

$$\operatorname{th}(a-b) = \frac{\operatorname{th} a - \operatorname{th} b}{1 - \operatorname{th} a \operatorname{th} b} \qquad \operatorname{th} p - \operatorname{th} q = \frac{\operatorname{sh}(p-q)}{\operatorname{ch} p \operatorname{ch} q}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{ch} 2x &= \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x & \operatorname{ch}^2 x &= \frac{\operatorname{ch} 2x + 1}{2} \\ &= 2 \operatorname{ch}^2 x - 1 \\ &= 1 + 2 \operatorname{sh}^2 x \end{aligned}$$

$$\operatorname{sh} 2x = 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x \qquad \operatorname{sh}^2 x = \frac{\operatorname{ch} 2x - 1}{2}$$

$$\operatorname{th} 2x = \frac{2 \operatorname{th} x}{1 + \operatorname{th}^2 x} \qquad \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} 2x}{\operatorname{ch} 2x + 1} = \frac{\operatorname{ch} 2x - 1}{\operatorname{sh} 2x}$$

En notant $t = \operatorname{th} \frac{x}{2}$, on a :

$$\operatorname{sh} x = \frac{2t}{1-t^2} \qquad \operatorname{ch} x = \frac{1+t^2}{1-t^2}$$

$$(\operatorname{ch} a + \operatorname{sh} a)^n = \operatorname{ch} na + \operatorname{sh} na$$

d'où

$$\begin{aligned} \operatorname{ch} 3a &= \operatorname{ch}^3 a + 3 \operatorname{ch} a \operatorname{sh}^2 a \\ &= 4 \operatorname{ch}^3 a - 3 \operatorname{ch} a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{sh} 3a &= 3 \operatorname{ch}^2 a \operatorname{sh} a + \operatorname{sh}^3 a \\ &= 4 \operatorname{sh}^3 a + 3 \operatorname{sh} a \end{aligned}$$

$$\operatorname{th} 3a = \frac{3 \operatorname{th} a + \operatorname{th}^3 a}{1 + 3 \operatorname{th}^2 a}$$